

PRISE EN CHARGE CLINIQUE

La prise en charge clinique désigne l'ensemble des soins apportés à un patient.

Sa qualité est évaluée par des indicateurs mesurant par exemple une pratique professionnelle ou la survenue de complications.

Médecine—Chirurgie



94.0 %

→ stable

Prise en charge de la douleur ?

Répartition nationale des établissements par niveau ?




Événements thrombo-emboliques après pose d'une prothèse totale de genou ?



Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu

Répartition nationale des établissements par niveau ?



Événements thrombo-emboliques après pose d'une prothèse totale de hanche ?



Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu

Répartition nationale des établissements par niveau ?



Soins Médicaux et de Réadaptation



96.0 %

Prise en charge de la douleur ?

Répartition nationale des établissements par niveau ?



COORDINATION DES PRISES EN CHARGE

Médecine—Chirurgie

69

Qualité de la lettre de liaison à la sortie ?

→ stable

Répartition nationale des établissements par niveau ?



Chirurgie Ambulatoire

70

Qualité de la lettre de liaison à la sortie ?

→ stable

Répartition nationale des établissements par niveau ?




Soins Médicaux et de Réadaptation

84

Qualité de la lettre de liaison à la sortie ?

→ stable

Répartition nationale des établissements par niveau ?



86

Projet de soins, projet de vie ?

→ stable

Répartition nationale des établissements par niveau ?



PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours de la prise en charge du patient. La prévention des infections est évaluée par des indicateurs mesurant par exemple les mesures de précaution ou la survenue d'infections post-opératoires.

Médecine—Chirurgie

Infections du site opératoire après pose d'une prothèse totale de hanche ?



Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu

Répartition nationale des établissements par niveau ?



66.7 %

Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact ?


Répartition nationale des établissements par niveau ?



96.7 %

Mise en place de précautions complémentaires contact ?

Répartition nationale des établissements par niveau ?



Infections du site opératoire après pose d'une prothèse totale de genou ?



Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu

Répartition nationale des établissements par niveau ?



66.7 %

Information au patient des pratiques de précautions complémentaires contact ?

Répartition nationale des établissements par niveau ?



137.8 %

→ stable

Consommation de solutions hydro-alcooliques (SHA) ?

Répartition nationale des établissements par niveau ?

